

Fuente del texto y de las imágenes: Digitalizado a partir del prospecto en papel.

## Anginovag

### Composición por 1 ml:

Dequalinio cloruro ..... 1,0 mg  
Enoxolona ..... 0,6 mg  
Acetato de hidrocortisona ..... 0,6 mg  
Tirotricina ..... 4,0 mg  
Lidocaína clorhidrato ..... 1,0 mg  
Excipientes:  
Sacarina sódica, Propilenglicol, Esencia de piña y Etanol 89,385% v/v.

### Indicaciones

#### Tratamiento preventivo-curativo de las afecciones bucofaríngeas:

Amigdalitis, Faringitis, Laringitis, Estomatitis, Úlceras y Aftas bucales, Glositis.

### Dosificación

**Dosis de ataque:** 1-2 aplicaciones cada 2-3 horas.

**Dosis de sostén o como preventivo:** 1 aplicación cada 6 horas.

### Normas para la correcta administración del preparado

Abrir bien la boca. Dirigir la boquilla inhaladora hacia la región afectada (garganta, boca, lengua, etc., según casos).

Presionar la parte superior de la cápsula de arriba a abajo hasta el tope, manteniendo el frasco en posición vertical.

El frasco se halla provisto de una válvula dosificadora: cada presión hasta el tope origina la salida regulada de medicamentos.

### Contraindicaciones, efectos secundarios e incompatibilidades

No se conocen.

### Advertencias

#### Importante para la mujer:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Este medicamento contiene 89,385 v/v de etanol en volumen final.

Cada aplicación contiene aproximadamente 0,075 g de etanol lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos.

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

**Intoxicación y posible tratamiento**

Dada la escasa toxicidad del preparado, no se prevé la intoxicación, ni aún la accidental.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

**Presentación**

Envases conteniendo 20 ml

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.**

**Laboratorios Novag, S.A.**

Gran Vía Carlos III, 94

Barcelona (España, Spain, Espagne)