

## **SAL DE FRUTA ENO**

### **COMPOSICIÓN**

#### **VIA ORAL**

Cada sobre contiene: Bicarbonato sódico: 2.319 g; Ácido cítrico: 2.181 g; Carbonato sódico anhidro: 0.500g;

### **PROPIEDADES**

SAL DE FRUTA ENO tiene acción antiácida

### **INDICACIONES**

Alivio sintomático de las molestias estomacales relacionadas con la hiperacidez (acidez de estómago, ardores).

### **POSOLOGIA**

**ADULTOS:** 1 ó 2 sobres disueltos en agua, repitiendo si es necesario cada ocho horas.

**NIÑOS:** Consultar al médico.

### **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES**

Consulte a su médico si padece hipertensión, insuficiencia cardíaca o renal, tiene propensión a la retención de aguas (edemas), o en general si está siguiendo un tratamiento con diuréticos o una dieta pobre en sodio o con poca sal ( este preparado contiene 811 mg de sodio por dosis). No utilizarlo de forma continuada durante más de 2 semanas sin consultar al médico. No tomarlo con el estómago demasiado lleno de comida o bebida

### **IMPORTANTE PARA LA MUJER**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

### **INTERACCIONES**

Consulte a su médico si está tomando otra medicación, porque los antiácidos pueden modificar la acción de otros medicamentos (tetraciclinas, anfetaminas, quinidina, carbonato de litio, sales de hierro). No tomarlo con leche o calcio.

### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Riesgo de retención de agua (edema). Flatulencia y eructos.

### **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

A grandes dosis o tratamientos continuados, alcalosis metabólica, que se manifiesta con los siguientes síntomas: debilidad, ansiedad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, pérdida de apetito. Interrumpir la medicación y consultar al médico o llamar al servicio

Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

### **PRESENTACIONES**

Envases con 10 sobres monodosis de 5 g. Frasco de 150 g de polvo efervescente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

### **SIN RECETA MEDICA**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,S.A.

C/ severo Ochoa,2 – 28760. Tres cantos (Madrid) Fabricado por:

Smithkline Beecham,S.A. Ctra. Ajalvir Km.2.500

28806 Alcalá de henares. (Madrid)